



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at <http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content>.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

plenty in quarries, *juxta ædes nob. v. D. Gryfidii Rice de Newton, arm. prope oppidum Sancti Teilavii, in comitatu Mariduniæ.* He calls it *Buglossa curta strigosa.* He also gives the figure of it without any description, in the *Phil. Trans.* N^o 243.

I beg you would communicate this supplement to the Royal Society in my name. I remain, with great esteem,

S I R,

London, July 12,
1753.

Your very humble servant,

Emanuel Mendez da Costa.

XLIII. *Letters relating to a Theorem of Mr. Euler, of the Royal Academy of Sciences at Berlin, and F. R. S. for correcting the Aberrations in the Object-Glasses of refracting Telescopes.*

I.

A Letter from Mr. James Short, F. R. S. to Peter Daval, Esq; F. R. S.

Dear Sir,

Read April 9, 1752. **T**HERE is published, in the Memoirs of the Royal Academy at Berlin, for the year 1747, a theorem by Mr. Euler, in which he shews a method of making object-glasses of telescopes, in such a manner, as not to be affected by

by the aberrations arising from the different refrangibility of the rays of light; these object-glasses consisting of two *meniscus* lens's, with water between them.

Mr. John Dollond, who is an excellent analyst and optician, has examined the said theorem, and has discovered a mistake in it, which arises by assuming an hypothesis contrary to the established principles of optics; and, in consequence of this, Mr. Dollond has sent me the inclosed letter, which contains the discovery of the said mistake, and a demonstration of it.

In order to act in the most candid manner with Mr. Euler, I have proposed to Mr. Dollond to write to him, shewing him the mistake, and desiring to know his reasons for that hypothesis; and therefore I desire, that this letter of Mr. Dollond's to me may be kept amongst the Society's papers, till Mr. Euler has had a sufficient time to answer Mr. Dollond's letter to him. I am,

S I R,

Sarrey-street, April 9,
1752.

Your most humble servant,

James Short.

A Letter from Mr. John Dollond to James Short, A. M. F. R. S. concerning a Mistake in M. Euler's Theorem for correcting the Aberrations in the Object-Glasses of refracting Telescopes.

S I R,

Read Nov. 23, 1752. **T**HE famous experiments of the prism, first tried by Sir Isaac Newton, sufficiently convinced that great man, that the perfection of telescopes was impeded by the different refrangibility of the rays of light, and not by the spherical figure of the glasses, as the common notion had been till that time; which put the philosopher upon grinding concave metals, in order to come at that by reflexion, which he despair'd of obtaining by refraction. For, that he was satisfied of the impossibility of correcting that aberration by a multiplicity of refractions, appears by his own words, in his treatise of Light and Colours, *Book I. Part 2. Prop. 3.* “ I found moreover, that when light goes out of air through several contiguous mediums, as through water and glass, as often as by contrary refractions it is so corrected, that it emergeth in lines parallel to those in which it was incident, continues ever after to be white. But if the emergent rays be inclined to the incident, the whiteness of the emerging light will by degrees, in passing on from the place of emergence, become tinged in its edges with colours.”

It is therefore, Sir, somewhat strange, that any body now-a-days should attempt to do that, which

so long ago has been demonstrated impossible. But, as so great a mathematician as Mr. Euler has lately published a theorem * for making object-glasses, that should be free from the aberration arising from the different refrangibility of light, the subject deserves a particular consideration. I have therefore carefully examined every step of his algebraic reasoning, which I have found strictly true in every part. But a certain hypothesis in page 285. appears to be destitute of support either from reason or experiment, though it be there laid down as the foundation of the whole fabrick. This gentleman puts $m:1$ for the ratio of refraction out of air into glass of the mean refrangible rays, and $M:1$ for that of the least refrangible. Also for the ratio of refraction out of air into water of the mean refrangible rays he puts $n:1$, and for the least refrangible $N:1$. As to the numbers, he makes $m = \frac{3}{2} \frac{1}{0}$, $M = \frac{7}{5} \frac{1}{0}$, and $n = \frac{4}{3}$; which so far answer well enough to experiments. But the difficulty consists in finding the value of N in a true proportion to the rest.

Here the author introduces the supposition above-mention'd; which is, that m is the same power of M , as n is of N ; and therefore puts $n = m^a$, and $N = M^a$. Whereas, by all the experiments that have hitherto been made, the proportion will come out thus, $m-1 : n-1 :: m-M : n-N$.

The letters fixed upon by Mr. Euler to represent the radii of the four refracting surfaces of his compound object-glass, are f g h and k , and the distance of the object he expresses by a ; then will the focal distance

$$bc = \frac{1}{n(\frac{1}{g} - \frac{1}{b}) + m(\frac{1}{f} - \frac{1}{g} + \frac{1}{b} - \frac{1}{k}) - \frac{1}{a} - \frac{1}{f} + \frac{1}{k}}.$$

Now, says

* Vide Memoires of the Royal Academy of Berlin for the Year 1747.

says he, it is evident, that the different refrangibility of the rays would make no alteration, either in the place of the image, or in its magnitude, if it were possible to determine the radii of the four surfaces, so as to have $n (\frac{1}{g} - \frac{1}{b}) + m (\frac{1}{f} - \frac{1}{g} + \frac{1}{b} - \frac{1}{k}) = N (\frac{1}{g} - \frac{1}{b}) + M (\frac{1}{f} - \frac{1}{g} + \frac{1}{b} - \frac{1}{k})$. And this, Sir, I shall readily grant. But when the surfaces are thus proportioned, the sum of the refractions will be $= 0$; that is to say, the emergent rays will be parallel to the incident. For, if $n (\frac{1}{g} - \frac{1}{b}) + m (\frac{1}{f} - \frac{1}{g} + \frac{1}{b} - \frac{1}{k}) = N (\frac{1}{g} - \frac{1}{b}) + M (\frac{1}{f} - \frac{1}{g} + \frac{1}{b} - \frac{1}{k})$, then $n - N (\frac{1}{g} - \frac{1}{b}) + m - M (\frac{1}{f} - \frac{1}{g} + \frac{1}{b} - \frac{1}{k}) = 0$. Also if $n - N : m - M :: n - 1 : m - 1$, then $n - 1 (\frac{1}{g} - \frac{1}{b}) + m - 1 (\frac{1}{f} - \frac{1}{g} + \frac{1}{b} - \frac{1}{k}) = 0$; or otherwise $n (\frac{1}{g} - \frac{1}{b}) + m (\frac{1}{f} - \frac{1}{g} + \frac{1}{b} - \frac{1}{k}) - \frac{1}{f} + \frac{1}{k} = 0$; which reduces the denominator of the fraction expressing the focal distance to $\frac{1}{a}$. Whence the focal distance will be $= a$; or, in other words, the image will be the object itself. And as, in this case, there will be no refraction, it will be easy to conceive how there should be no aberration.

And now, Sir, I think I have demonstrated, that Mr. Euler's theorem is intirely founded upon a new law of refraction of his own; but that, according to the laws discover'd by experiment, the aberration arising from the different refrangibility of light at the object-glass cannot be corrected by any number of refractions whatsoever. I am,

S I R,

London, March 11, Your most obedient humble servant,
1752.

John Dollond.

*Mr. Euler's Letter to Mr. James Short,
F. R. S.*

Monfieur,

Read July 8,

1753.

VOUS m'avez fait un tres fenfible plaisir, en ayant difpofé M. Dollond de remettre la proposition de fes objections contre mes verres objectifs, jufqu' à ce que j'y aurois repondu, et je vous en fuis infiniment obligé. Je prend donc la liberté de vous adreffer ma reponfe à lui, en vous priant, après l'avoir daignée de votre examen, de la vouloir bien lui remettre : et en cas que vous jugiez cette matiere digne de l'attention de la Societé Royale, je vous priois de lui communiquer les preuves détaillées de ma theorie, que j'ai expofée dans cette lettre. Cependant j'efpere, que M. Dollond en fera fatisfait, puifque je tombe d'accord avec lui du peu de fucces, qu'on fauroit fe promettre de mes objectifs, en les travaillant felon la maniere ordinaire.

J'ai l'honneur d'etre, avec la plus parfaite confideration,

Monfieur,

Berlin, 19 Juin,

1752

Votre tres humble, et

tres obéiffant ferviteur,

L. Euler.

A Monsieur Monsieur Dollond.

Monsieur,

Read July 8,

1753.

ETANT tres sensible à l'honneur que vous me faites, au sujet des verres objectifs, que j'avois proposé, j'ai celui de vous marquer d'abord ingenuement, que j'ai rencontré aussi ici le plus grands obstacles dans l'exécution de ce dessein, vu qu'il s'agit de quatre faces, qui doivent être travaillée exactement selon les proportions que j'avois trouvées : cependant ayant fait les expériences sur quelquesuns, qui parurent le mieux reussir, nous avons trouvé, que l'intervalle entre les deux foyers des rayons rouges et violets étoit beaucoup plus petit, qu'il ne seroit d'un verre simple de la même distance focale. Neantmoins je dois avouer, qu'un tel verre, quand même il bien seroit parfaitement exécuté sur mes principes, auroit d'autres défauts, qui le mettroient au dessous même des verres ordinaires : c'est qu'un tel verre n'admet qu'un tres petite ouverture en conséquence des grandes courbures, qu'on doit donner aux faces intérieures : desorte que lorsqu'on donne une ouverture ordinaire, l'image devient tres confus.

Ainsi puisque vous vous êtes donné la peine, Monsieur, d'exécuter de tels verres, en en faisant des expériences *, je vous prie de bien distinguer les défauts, qui peuvent naître de la diverse réfrangibilité des rayons, de ceux, qui viennent d'une trop grande ouverture : pour cet effet vous n'aurez qu'à laisser une tres petite ouverture.

Or

* Mr. Dollond, in his letter to Mr. Euler, here referred to, does not say that he had made any trials himself, but only he had understood that such had been made by others, without success.

Or si ma theorie etoit juste, dont j'aurai bientot l'honneur de parler, il seroit moyen de remedier à ce defect; il faudroit renoncer à la figure spherique qu'on donne ordinairement aux faces des verres, et tacher de leur donner une autre figure, et j'ai remarqué que la figure d'une parabole leur procureroit l'avantage, qu'ils admettroient une ouverture tres considerable. Notre savant M. Lieberkuhn s'est appliqué à travailler des verres dont la courbure des faces décroît depuis le milieu vers le bords, et il s'en est aperçu de tres grands avantages. Par ces raisons je crois, que ma theorie ne souffre encore rien de ce coté.

Pour la theorie, je conviens avec vous, monsieur, que posant la raport de refraction d'un milieu dans un autre quelconque pour les rayons moyens comme m à 1, et pour les rayons rouges comme M à 1, la raison de $m-M$ à $m-1$ sera toujours si à peu près constant, qu'elle satisfera à toutes les experiences, comme la grand Newton a remarqué. Cette raison ne differe non plus de ma theorie que presque imperceptiblement: car puisque je soutiens que $M=m^a$, et que m differe ordinairement fort peu de l'unité, soit $m=1+\omega$; et puisque $M=m^a=1+\alpha l m$ à peu pres, et $l(1+\omega)=lm=\omega$, aussi fort à peu pres, j'aurai $m-M=1+\omega-1-\alpha\omega=(1-\alpha)\omega$, et $m-1=\omega$, donc la raison $\frac{m-M}{m-1}$ sera $=1-\alpha$, ou fort à peu pres constante. Delà je conclud, que les experiences d'ou le grand Newton a tiré son raport, ne sauroient etre contraires à ma theorie.

En second lieu, je conviens aussi que si la raison $\frac{m-M}{m-1} = \text{Const.}$ etoit juste à la rigueur, il n'y auroit

plus

plus moyen de remedier au defaut qui refulte de la di-
verfe refrangibilité des rayons, de quelque maniere
qu'on difpoferoit divers milieux transparens, et que
l'intervalle entre les divers foyers tiendrait toujours un
raport constant à la diftance focale entiere du verre.
Mais c'eft precifement cette confideration, qui me
fournit le plus fort argument : l'oeil me paroît une
telle machine dioptrique parfaite, qui ne fe refsent en
aucune maniere de la diverfe refrangibilité des rayons :
quelque petite que foit fa diftance focale, la fenfibilité
eft fi grande, que les divers foyers, s'il y en avoit, ne
manqueroient pas de troubler tres confiderablement
la vifion. Or il eft bien certain, qu'un oeil bien con-
ftitué ne sent point l'effet de la diverfe refrangibilité.

La ftructure merveilleux de l'oeil, et les diverfes
humeurs, dont il eft compofé, me confirme infiniment
dans ce fentiment. Car s'il s'agiffoit feulement
de produire une representation fur le fond de l'oeil,
une feule humeur auroit été fuffifante ; et le Createur
n'y auroit pas feurement employé plufieurs. Delà
je conclud, qu'il eft poffible d'anéantir l'effet de la
diverfe refrangibilité des rayons par une juftte arrange-
ment de plufieurs milieux transparens, donc puifque
cela ne feroit pas poffible, fi la formule $\frac{m - M}{m - 1} =$

Conf. étoit vraye à la rigueur, j'en tire la confe-
quence qu'elle n'eft pas parfaitement conforme à la
nature.

Mais voila une preuve directe de ma thefe : je conçois
diverfe milieux transparens, *A, B, C, D, E, etc.* qui
different entr'eux également par raport à leur denfité
optique : deforte que la raifon de refraction de cha-
cun dans le fuivant foit le meme. Soit donc dans le
paffage

passage du premier dans le second la raison de refraction pour les rayons rouges $= r : 1$, et pour les violets $= v : 1$; qui sera la même dans le passage du second dans le troisième, de celui-ci dans le quatrième, du quatrième dans le cinquième, et ainsi de suite. Delà il est clair, que dans le passage du premier dans le troisième sera $= r^2 : 1$ pour les rayons rouges, et $= v^2 : 1$ pour les violets : de même dans le passage du premier dans le quatrième les raisons seront $r^3 : 1$ et $v^3 : 1$.

Donc si dans le passage dans un milieu quelconque la raison de refraction des rayons rouges est $= r^n : 1$, celle des rayons violets sera $= v^n : 1$; tout cela est parfaitement conforme aux principes du grand Newton. Posons $r^n = R$, et $v^n = V$, de sorte que $R : 1$, et $V : 1$ expriment les raisons de refraction des rayons rouges et violets dans un passage quelconque : et ayant $n/r = lR$ et $n/v = lV$ nous aurons $lR : lr = lV : lv$, ou $\frac{lR}{lV} = \frac{lr}{lv}$. Ou bien mettez $v = r^\alpha$, et à cause

de $lv = \alpha lr$, on aura $\frac{lR}{lV} = \frac{1}{\alpha}$, ou $lV = \alpha lR$, et partant $V = R^\alpha$.

Voilà donc le fondement du principe, que j'ai employé dans ma pièce, qui me paroît encore inébranlable : cependant j'en soumetts la décision à l'illustre Société Royale, et à votre jugement en particulier, ayant l'honneur d'être avec la plus parfaite considération, Monsieur,

Berlin, Juin 15,
1752.

Votre très humble

et très obéissant serviteur,

L. Euler.

XLIV.